

A-16



Practical of
Botany

R. K. GROUP OF COLLEGE

BEHIND KALWAR POLICE STATION, KALWAR, JAIPUR (RAJ.)



B.Sc - II SEM Botany

INDEX

- Gel electrophoresis
- Isolation of genomic DNA from onion

Genetics

- Back cross
- Dihybrid cross
- Monohybrid cross

Apparatus

- Autoclave
- Centrifuge Machine
- pH Meter
- LAF
- Compound microscope

Pteridophyta

- Marsilea sporocarp
- Selaginella cone
- Equisetum
- Selaginella stem (T.S)
- Rhynia plant

Gymnosperm

- Pinus male cone
- Cycas leaflet T.S
- Cycas Coralloid root T.S
- Cycas normal root
- Ephedra
- Pinus needle

(g) जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस (Gel Electrophoresis)

- (1) जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक आधुनिक तकनीक है जिसके द्वारा प्रोटीन, एन्जायम, डीएनए, आरएनए आदि के अणुओं को आसानी से अलग किया जा सकता है।
- (2) जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक में एक ट्रफ का प्रयोग किया जाता है जो पारदर्शी होता है व इसमें बफर भर कर इसके मध्य में अगारोज जैल या पॉलीएक्रीलेमाइड जैल को स्तंभ के रूप में पारदर्शी पट्टियों के बीच में रख दिया जाता है। यह एक ढक्कन द्वारा ढका रहता है जिससे जेल सुरक्षित रहता है।
- (3) पॉली एक्रीलेमाइड जैल समांगी, पारदर्शी, ताप स्थिर तथा अनआयनित होता है।
- (4) इस उपकरण में कोम्ब व कोम्ब स्टैंड होते हैं। एक्रिलिक कोम्ब द्वारा 7 वेल (well) बनाये जा सकते हैं।
- (5) धारा प्रवाहित करने हेतु इस उपकरण में दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इसमें कैथोड व एनोड लगा होता है।
- (6) परीक्षण मिश्रण (sample) को जैल के बीच में रखे सीधे (vertical) स्तंभ (well) में भरने के पश्चात् स्थिर वोल्टेज की धारा प्रवाहित की जाती है जिससे मिश्रण में उपस्थित अणु अपने आवेश तथा आण्विक भार के अनुसार गति करने लगते हैं।
- (7) एनोड की ओर एनायन (anion) तथा कैथोड की ओर धनायन (cation) गमन करते हैं। यह चलन (movement) उनके अणुओं के आकार व भार के व्युत्क्रमानुपाती (inversely proportional) होता है।
- (8) इलेक्ट्रोफोरेसिस जब सम्पूर्ण हो जाता है तब इसका पराबैंगनी फोटोग्राफ (UV photograph) या ऑटोरेडियोग्राम लिया जाता है तथा इन चित्रों में जैल पर स्थित अणु अलग-अलग पट्टिकाओं (bands) के रूप में व्यवस्थित दिखाई देते हैं जिनका वैज्ञानिक विश्लेषण कर लेते हैं।




Fig. 8 : Gel Electrophoresis unit

प्याज के कंद से डीएनए विलगन करना (Isolation of DNA from Onion bulb)

डीएनए विलगन हेतु प्याज के ऊतकों का उपयोग किया जाता है। यह तकनीक आसान व शीघ्रता से सम्पन्न हो सकती है। प्याज का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध होता है, इसकी लागत कम है तथा इसमें मंड की मात्रा बेहद कम होती है। इस प्रक्रिया में प्रथम चरण होमोजिनाइजेशन (homogenization) होता है। इसमें प्याज के ऊतकों को गर्म करके इसमें जैविक (biological) डिटरजेंट सोडियम डोडिसिल सल्फेट (SDS) व नमक का घोल मिलाया जाता है जिससे फॉस्फोलिपिड की भित्ति कमजोर होकर टूट जाती है। दूसरे चरण में प्रोटीएज एन्जायम पैपेन का उपयोग किया जाता है जिससे डीएनए से चिपके हुए प्रोटीन हट जाते हैं व यह प्रक्रिया डीप्रोटीनाइजेशन (deprotenization) कहलाती है। तीसरे चरण में ठंडे इथाइल एल्कोहॉल के उपयोग से डीएनए का अवक्षेपन (precipitation) हो जाता है तथा बाकी सभी कोशिकांग फिल्ट्रेट में इकट्ठे हो जाते हैं तथा डीएनए फिल्ट्रेट व इथाइल अल्कोहॉल के मध्य भाग पर केन्द्रित हो जाता है जहाँ से उसे आसानी से काँच की छड़ से ले सकते हैं।

आवश्यकतायें (Requirements)

डिटरजेन्ट पाउडर, बिना आयोडीन वाला नमक, अन्नानास या पपीता, इथाइल एल्कोहॉल, आसुत जल, फीनोल रेड, टेस्ट ट्यूब इत्यादि।

1. डिटरजेन्ट-साल्ट विलयन बनाना (To prepare detergent salt solution) : 10 gm डिटरजेन्ट (सोडियम डोडिसिल सल्फेट) (Sodium dodecyl sulfate-SDS) व 10 gm बिना आयोडीन नमक को 90 ml आसुत जल में घोल कर डिटरजेंट साल्ट विलयन तैयार कीजिए।

विलयन तैयार करना (Preparation of Solutions)

1. डिटरजेन्ट-साल्ट विलयन बनाना (To prepare detergent salt solution) : 10 gm डिटरजेन्ट (सोडियम डोडिसिल सल्फेट (Sodium dodecyl sulfate-SDS) व 10 gm बिना आयोडीन नमक को 90 ml आसुत जल में घोल कर डिटरजेंट साल्ट विलयन तैयार कीजिए। SDS के स्थान पर कोई भी उपलब्ध डिटरजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

2. अन्नानास या पपीते का रस बनाना (To prepare juice of Pineapple or Papaya) : 5 gm पपीते या अन्नानास के टुकड़ों को 100 ml आसुत जल में घोलिये जिससे विलयन की सान्द्रता 5% हो जाये।

3. 95% इथाइल एल्कोहॉल को फ्रिज में रखकर हिमशीतन (ice cold) करना।

4. बिना आयोडीन का नमक 5 gm लेकर उसे 100 ml आसुत जल में घोलकर 5% NaCl की सान्द्रता का विलयन तैयार करना।

5. फीनॉल रक्त (phenol red) पाउडर की कुछ मात्रा लेकर आसुत जल में घोलना जिससे जल हल्का गुलाबी हो जाये।

डीएनए विलग करना (To isolate DNA)

विधि प्रथम (Procedure-I)

- डिटरजेंट साल्ट विलयन को बीकर में लेकर वाटर बॉथ (water bath) पर तब तक गर्म करें जब तक इसका तापमान 60° नहीं हो जाये।
- प्याज के छोटे टुकड़े काट कर इन्हें विलयन में डालकर 15 मिनट तक हिलायें। तापमान 60°C से ऊपर नहीं हो जाये इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
- 15 मिनट बाद बीकर को आइस बॉथ में 5 मिनट के लिए रख दें। आइस बाथ में बीकर को धीमे से हिलाते रहिये ताकि बीकर के चारों तरफ का तापमान कम हो जाये।

4. बीकर के विलयन को सेन्ट्रीफ्यूज की ट्यूब में रखकर 45 सेकण्ड तक कम स्पीड व 30 सेकण्ड तक उच्च स्पीड पर चलायें।
5. ट्यूब से विलयन को निकालकर 1000 ml के बीकर में डाल दें व इस बीकर को आइस-बाथ पर 15-20 मिनट तक रखें।
6. इस बीकर के विलयन को एक 500 ml के बीकर में डालें जिसका मुख मलमल (cheese cloth) की चार सतह से बांध रखा हो।
7. इस बीकर में ठंडा 95% इथेनॉल बीकर के एक तरफ से धीरे धीरे डालें। इथेनॉल की ऊपरी सतह पर डीएनए इकट्ठा हो जाता है जिसे काँच की छड़ से निकाल कर अलग ट्यूब में इकट्ठा करके फ्रीजर में संग्रहित करें।




Fig. 1 : Isolation of DNA

विधि II (Procedure II)

1. एक 100 ml का बीकर लेकर उसमें प्याज के कुछ टुकड़े डालें। इसमें डिटरजेंट-साल्ट विलयन डालकर काँच की छड़ से अच्छी तरह मिला लें।
2. बीकर का ऊपरी विलयन (supernatant) लेकर उसे एक टेस्ट-ट्यूब में डाल लें।
3. इस टेस्ट-ट्यूब में 3-4 ml प्रोटीएज एन्जाइम पैपेन का रस डाल कर अच्छी तरह मिला लें।
4. इस टेस्ट ट्यूब में 10 ml आइस कोल्ड इथेनॉल टेस्ट ट्यूब की एक तरफ से धीरे-धीरे डालें जिससे प्याज के विलयन के ऊपर एक सतह (layer) निर्मित हो जाये।
5. इस टेस्ट ट्यूब को 5 मिनट तक स्टेन्ड पर रख दें। विलयन व इथेनॉल के मध्य स्थल (interphase) पर डीएनए एकत्रित होने लगता है क्योंकि यह इथेनॉल में घुलनशील (soluble) नहीं है।
6. इस डीएनए को काँच की छड़ से उठा कर एक टेस्ट ट्यूब में डालें जिसमें साल्ट विलयन रखा हो।
7. इस टेस्ट ट्यूब में फीनॉल इन्डिकेटर डालें। पीला रंग डीएनए की उपस्थिति दर्शाता है।

परिणाम (Result)

टेस्ट ट्यूब में फीनॉल रक्त (phenol red) डालने पर विलयन का रंग पीला हो जाता है जो इसमें डीएनए की उपस्थिति दर्शाता है।

सावधानियाँ (Precautions)

1. ताजा प्याज इस्तेमाल करना चाहिये।
2. विलयन ध्यानपूर्वक बनाने चाहिए।
3. डीएनए को सावधानीपूर्वक काँच की छड़ से उठाना चाहिये।


Back Cross

प्रश्न 7. F₁ पादपों जिनका जीनोटाइप अज्ञात है, को यदि समीजीनी अप्रभावी तथा प्रभावी जनकों के साथ क्रॉस करवाया जाये तो F₂ पीढ़ी में संतति का फीनोटाइप तथा जीनोटाइप का अनुपात क्या होगा ?

Parent

Tall plant
TT

Dwarf plant
tt



F₁ Generation

Result F₁ :


Phenotype : All Tall

Genotype : Tt

(a) Back cross with dominant homozygous parent

Tall
Tt (heterozygous)

Tall
TT (homozygous)



F₂ Generation

Result F₂ :


Phenotypes : All Tall

Genotypes : 2TT : 2 Tt (1 : 1 ratio)

Homogyzous : Heterozygous
Tall Tall

स्पष्टीकरण (Explanation) : जब F₁ पादपों को किसी भी प्रभावी या अप्रभावी समजीनी जनक के साथ क्रॉस करवाया जाये तो यह बैक क्रॉस (Backcross) कहलाता है जो यदि 100 प्रतिशत प्रभावी लक्षण प्रकट करता है तो जनक का जीनोटाइप प्रभावी TT होता है।



प्रश्न 10. जनकों में जीनोटाइप $RRrr$ तथा $rryy$ है। बीज का पीला रंग प्रभावी व हरा रंग अप्रभावी है। R तथा r क्रमशः गोल तथा सिकुड़े आकार के बीज प्रदर्शित करते हैं। सिद्ध कीजिए कि F_2 पीढ़ी पादपों में पीला व हरा रंग 3:1 के अनुपात में अलग हो गया तथा गोल व सिकुड़े बीजों का अनुपात भी यही रहा। जीनोटाइप एक अलग पुनेट चक्र बना कर लिखिये।



मेण्डल के नियमों पर आधारित (Problems based on Mendels Laws of Inheritance)

Monohybrid cross

प्रश्न 1. सत्य प्रजनित (true breeding) लंबे पादप तथा सत्य बौने पादप में एकसंकर क्रॉस करवाने पर कितने प्रकार के जीनोटाइप व फीनोटाइप F₁ तथा F₂ पीढ़ी में उत्पन्न होंगे ?



स्पष्टीकरण (Explanation) लम्बे व बौने पादप को F₁ में क्रॉस करवाने पर मात्र एक प्रकार के फीनोटाइप लम्बे पादप जिनका जीनोटाइप Tt है उत्पन्न होते हैं। इनमें स्वपरागण करवाने पर F₂ पीढ़ी में फीनोटाइप में 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है। जिसमें 3 लम्बे व एक बौना पादप निम्न जीनोटाइप 1TT : 2Tt : 1tt के प्राप्त होंगे।

(c) ऑटोक्लेव (Autoclave)

- (1) ऑटोक्लेव ग्लॉसवेयर, संवर्धन विभिन्न प्रकार के माध्यमों, कॉटन, फिल्टर पेपर, औजार इत्यादि को निजर्मीकरण के काम आता है।
- (2) निजर्मीकरण हेतु यह उपकरण बहुत उपयोगी माना जाता है। यह सूक्ष्मजीव युक्त ठोस व तरल माध्यमों के लिए उपयुक्त होता है। यह उन सभी वस्तुओं एवं पदार्थों के लिए होता है जिन पर अधिक ताप का असर नहीं होता।
- (3) ऑटोक्लेव स्टील अथवा कॉपर का बेलनाकार, दोहरी भित्ति युक्त होता है जिसका एक हिस्सा ढक्कन के रूप में खुलता है तथा जिसे खोलकर जिन पदार्थों को ऑटोक्लेव करना होता है उन्हें अंदर रख देते हैं।
- (4) ऑटोक्लेव के ढक्कन (lid) के ऊपर प्रेशर गॉज (प्रेशर मापन हेतु) व स्टीम कॉक (निर्वात वाल्व-exhaust valve) ऑटोक्लेव चेम्बर में निर्वात उत्पन्न करने के लिए पाया जाता है।
- (5) ऑटोक्लेव में एक सेफ्टी वाल्व तथा एक नियंत्रण (control) पुर्जा होता है जिसके समायोजन (adjustment) से इस उपकरण के अंदर ताप तथा प्रेशर को नियंत्रित किया जाता है।




Fig. 4 : Autoclave

(b) सेन्ट्रीफ्यूज (Centrifuge)

- (1) यह एक ऐसा उपकरण होता है जो बहुत उच्च गति पर घूम कर कणों अथवा पदार्थों को अपकेन्द्री बल (centrifugal force) के द्वारा उनके सघनता व द्रव्यमान बल (density mass) के आधार पर अलग कर देता है।
- (2) सेन्ट्रीफ्यूज एक धातु का बना उपकरण होता है जिसमें एक स्टैंड होता है। ऊपर का हिस्सा चौड़ा होता है जिसमें धातु के कप होते हैं जिनमें टेस्ट ट्यूब रखी जाती है। इसके आधार पर मोटर होती है जिसके द्वारा यह तेजी से घूम सकता है तथा इस घूर्णन गति से टेस्ट ट्यूब में रखे हुए पदार्थ या कण अलग हो जाते हैं।
- (3) सेन्ट्रीफ्यूज सामान्यतः तीन प्रकार का होता है।
 - (i) कम गति सेन्ट्रीफ्यूज—गति सीमा = 500 rpm
 - (ii) उच्च गति सेन्ट्रीफ्यूज—गति सीमा = 20,000 rpm
 - (iii) अल्ट्रा सेन्ट्रीफ्यूज—गति सीमा = 60,000 rpm




Fig. 3 : Centrifuge

- (4) अपकेन्द्री बल को परिमाण/मिनट (revolution per minute = rpm) अथवा कोणिक गति (angular speed) में ज्ञात किया जाता है।

अपकेन्द्री बल = कोणिक वेग x त्रिज्या

(Centrifugal force) = (angular velocity) x (radius)

कोणिक वेग, घूर्णन (rotation) प्रति मिनट द्वारा दर्शाया जाता है।

कोणिक वेग = $2\pi \times \text{rpm} / 60$ त्रिज्या/सेकेण्ड

अपकेन्द्री बल सामान्यतः आपेक्षिक या सापेक्ष अपकेन्द्री क्षेत्र (Relative Centrifugal Field) (RCF) 'g' इकाई में दर्शाया जाता है।

सावधानियाँ- ध्यान रखना चाहिए कि सेन्ट्रीफ्यूज में पदार्थ रखने से पूर्व कप में उसकी मात्रा उचित हो।

(f) pH मीटर (pH Meter)

- (1) सोरेन्सन (Sorenson) ने 1909 में pH शब्द का उपयोग H आयन की सान्द्रता को सरल तरीके से समझाने के लिए किया।
- (2) किसी भी विलयन में उपस्थित प्रभावकारी H आयनों की सान्द्रता के ऋणात्मक लघुगुणक (negative log) को pH का मान कहा जाता है।
- (3) pH का मान pH मीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसके द्वारा विलयन की अम्लीयता व क्षारीयता को ज्ञात किया जाता है।
- (4) pH उपकरण में दो इलेक्ट्रोड व एक pH डायल होता है।
- (5) एक ग्लास इलेक्ट्रोड होता है जिसकी नलिका ऊपर से बंद होती है व इसका ऊपरी सिरा सिल्वर क्लोराइड का बना होता है। यह ग्लास इलेक्ट्रोड एक बाहरी नलिका में रखा होता है। इस नलिका में 1N HCl (ज्ञात pH) का विलयन भरा होता है।
- (6) एक रेफरेन्स इलेक्ट्रोड होता है। इसमें मर्करी/मरक्यूरस क्लोराइड/ सिल्वर-सिल्वर क्लोराइड से निर्मित धातु का बना आंतरिक एलीमेंट होता है जो KCl (एक इलेक्ट्रोलाइट) के सन्तृप्त विलयन में डूबा रहता है।

(7) दोनों इलेक्ट्रोड pH डायल से जुड़े होते हैं।

(8) pH मीटर द्वारा किसी विलयन का pH ज्ञात करने के लिए उसका मानकीकरण किया जाता है।

pH मीटर का मानकीकरण व pH मापन

1. सबसे पहले pH मीटर को ऑन करके इसमें विद्युत आवेश प्रवाहित करते हैं।
2. ज्ञात pH की टिकिया को बफर में घोलकर ज्ञात pH का विलयन तैयार कर लेते हैं।
3. रेफरेन्स इलेक्ट्रोड को ज्ञात pH (5, 6, या 7) विलयन में डालकर इंडिकेटर को उसी pH पर स्थिर कर लेते हैं।
4. इलेक्ट्रोड को बाहर निकाल कर आसुत जल से धोकर 5 pH वाले विलयन में डुबोने पर pH का मान 5 होगा।




Fig. 7 : pH meter

सावधानियाँ (Precautions)

1. सतप्त KCl के विलयन को एक निश्चित अन्तराल के पश्चात् पुनः भरा जाना चाहिए अन्यथा यह सूखता जाता है।
2. इलेक्ट्रोड को विलयन में से हटाने से पहले सदैव pH मीटर की ऑन नॉब को ऑफ कर दें। वह नॉब जिसको ऑन करके pH मीटर की रीडिंग ली जाती है। हैं।

(a) लेमिनार एयर फ्लो (Laminar Air Flow)

लेमिनार कक्ष (Laminar Flow) में निर्जमीकृत परिस्थितियों में पोष माध्यमों (Culture Media) कर्तौतकों/एक्सपादप (explants) को स्थानान्तरित करने अथवा आरोपण (Inoculation) हेतु प्रयोग किया जाता है। इसमें एक हीपा फिल्टर (Hepa Filter) पृथ्वी के 90° कोण पर तथा काम करने हेतु वर्क बेन्च पृथ्वी के समानान्तर स्थित रहती है।

यह 8×112 फीट का एक कक्ष होता है। इसमें सभी आवश्यक उपकरण व सामग्री जैसे स्केलपल, पिपेट, कटर, कैंची, चिमैटी, बुन्सन बर्नर, निजर्मी फ्लास्क, पेट्रीप्लेट, ब्लेड, इत्यादि वर्क बेंच पर सजे रहते हैं। इसमें पराबैंगनी प्रकाश द्वारा निजर्मीकरण किया जाता है।




Fig. 1 : Laminar Air flow Chamber

लैमिनार फ्लो के प्रकार (Types of Laminar Flow)

लैमिनार फ्लो दो प्रकार के होते हैं।

(i) क्षैतिज लैमिनार फ्लो हुड (Horizontal Laminar Flow Hood)

इसमें 108 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से निजर्मीकृत हवा क्षैतिज रूप से प्रवाहित होती रहती है जिसमें कक्ष निजर्मीकृत बना रहता है।

(ii) उर्ध्वाधर लैमिनार फ्लो हुड (Vertical Laminar Flow Hood)

इसमें हवा उर्ध्वाधर रूप से प्रवाहित होता है। लैमिनार फ्लो में वायु सर्वप्रथम फिल्टर के माध्यम से गुजरती है जिससे इसके बड़े कण फिल्टर हो जाते हैं। तत्पश्चात Hepa (High Efficiency Particulate air) उच्च दक्षता युक्त वायु कण फाइबर ग्लास फिल्टर (Fiber glass filter) से गुजरती है जो 0.3μ से अधिक बड़े आकार के कणों को फिल्टर करती है।

विधि (Procedure)

1. सर्वप्रथम लैमिनार फ्लो का स्विच ऑन कर दें।
2. लगभग 30 मिनट पहले UV प्रकाश को आन करें जिसमें निजर्मीकरण पूरी तरह से सम्पन्न हो जाये।
3. हवा का प्रवाह इस प्रकार रखना चाहिए कि प्रदूषित हवा बाहर निकल जाये।
4. काम करने से पूर्व अपने वर्क बैच, हाथों को व ग्लास वेयर को एल्कोहल से साफ कर लें। मगर सावधानी रखें कि ऐसा करते समय बर्नर ऑफ रहे।
5. स्थानान्तरण करते समय बर्नर जला लें व सावधानी पूर्वक सांस अन्दर रोक कर कार्य करें।





Fig. 2 : Apparatus placed on bench of Laminar-air-flow

1. Rimless culture tube, 2. Tissue paper, 3. Distilled water, 4. Aluminium foil, 5. Petridish, 6. Burner, 7. Forceps, 8. Scalpel

संयुक्त सूक्ष्मदर्शी (Compound Microscope)

संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा विभेदन क्षमता (resolution) साधारण सूक्ष्मदर्शी की तुलना में अधिक होती है। दृश्य प्रकाश 380-740 nm का प्रयुक्त होता है जिसकी आवर्धन क्षमता 100-400 (X) होती है। इसकी आवर्धन क्षमता को तेल निमज्जन (oil immersion) लेंस की मदद से 1000 गुना बढ़ाया भी जा सकता है। इनमें एक नेत्रिका व दो नेत्रिकायें युक्त सूक्ष्मदर्शियों को क्रमशः एकनेत्री व (monocular) व द्विनेत्री सूक्ष्मदर्शी कहते हैं।



चित्र : 6. संयुक्त सूक्ष्मदर्शी

✓ स्पोरोकार्प (Sporocarp)

(i) स्पोरोकार्प अण्डाकार अथवा रोम के बीज जैसे होते हैं। ये पर्णवृन्त के आधारीय भाग पर छोटे वृन्त पर स्थित रहते हैं। ज्यादातर जातियों में वृन्त अशाखित होता है जिसके सिरे पर एकमात्र स्पोरोकार्प लगता है। कुछ में सभी वृन्त जुड़े रहते हैं जिनके मुक्त शीर्षों पर 2 से 5 स्पोरोकार्प उत्पन्न होते हैं।

तरुण अवस्था में स्पोरोकार्प मुलायम तथा हरे रंग के होते हैं परन्तु परिपक्व होने पर सख्त और भूरे रंग के हो जाते हैं। कुछ जातियों में यह हमेशा पानी के अन्दर ही बनते हैं जबकि कुछ जातियों में यह पानी के पूर्णतः सूखने के पश्चात् पादप के स्थलीय होने पर उत्पन्न होते हैं।

स्पोरोकार्प लगभग द्विपार्श्विक सममित (biconvex) तथा कुछ चपटी संरचना होती है जो वृन्त (peduncle) द्वारा पर्णवृन्त के आधारीय भाग से जुड़ा होता है।

इसके वृन्त तथा स्पोरोकार्प के बीच मध्यतल (median plane) पर एक या अधिक दन्त समान उभार उपस्थित होते हैं जिन्हें गुलिका अथवा ट्यूबरकल कहते हैं। ट्यूबरकल एक या दो पाये जाते हैं। कुछ जातियों में यह अनुपस्थित होते हैं। वृन्त का वह किसी में भाग जो स्पोरोकार्प की पीठ से जुड़ा रहता है, रैफी कहलाता है।

स्पोरोकार्प की आन्तरिक संरचना (Internal structure of sporocarp)

स्पोरोकार्प की भित्ति (Wall of sporocarp)— स्पोरोकार्प की भित्ति अत्यधिक मोटी तथा प्रतिरोधक होती है। विकसित स्पोरोकार्प की भित्ति तीन पर्तीय होती है। सबसे बाहरी सतह चौड़ी तथा स्तम्भाकार कोशिकाओं से बनती है जो बाह्य त्वचा कहलाती है। इसमें रन्ध्र पाये जाते हैं यह क्यूटिकल तथा रोम द्वारा घिरी रहती है।

बाह्य त्वचा के भीतर दो पर्तीय अधश्त्वचा उपस्थित रहती है जो बाहरी तथा भीतरी खम्भ (palisade) कोशिकाओं से बनती हैं। बाहरी खम्भ कोशिकायें लम्बी व पतली भित्ति वाली कोशिकायें होती हैं। दोनों सतहों की कोशिकाओं में पर्ण हरित (chloroplast) पाया जाता है।

अधश्त्वचा के नीचे ऑवर ग्लास जैसी कोशिकायें (hour glass like cells) उपस्थित होती हैं। जिनकी भित्ति मोटी होती है। सबसे भीतरी सतह मृदुतकीय कोशिकाओं से बनती है। ये जिलेटिनस ऊतक होते हैं जो स्पोरोकार्प के स्फुटन में सहायता करते हैं। यह जिलेटिनस ऊतक स्पोरोफोर (sporophore) कहलाते हैं।

यह पृष्ठधारीय विच्छेद (dorsiventral plane) में स्पोरोकार्प के अन्दर एक पूरी रिंग के रूप में उपस्थित रहते हैं जिसे जिलेटिनस रिंग कहते हैं।

स्पोरोकार्प का क्षैतिज काट (Horizontal section of sporocarp)

मासीलिया स्पोरोकार्प के H.L.S. में से कटा हुआ वृन्त व स्पोरोकार्प की भित्ति व सोराई की पंक्तियाँ भी दिखती हैं।

इस विच्छेद में सोराई की दो पंक्तियाँ दिखाई देती हैं जो एकान्तरित क्रम से व्यवस्थित होती हैं। इस काट में स्पोरोकार्प में सोराई की संख्या ज्ञात की जा सकती है।

इस काट में स्पोरोकार्प के दोनों अन्तस्थ सिरों पर जिलेटिनस वलय पायी जाती है। अपाक्ष रिंग अभ्यक्ष रिंग से बड़ी होती है।

गुरुबीजाणुधानी पहले तथा लघुबीजाणुधानी बाद में विकसित होती है।

प्लेसेन्टल संवहन बण्डल तथा कमिश्नरल बण्डल अनुप्रस्थ काट में उपस्थित होते हैं। वृन्त अनुप्रस्थ काट के रूप में उपस्थित रहता है।

उदग्र अनुप्रस्थ काट (Vertical transverse section)–

मासीलिया के स्पोरोकार्प के VTS में स्पोरोकार्प की भित्ति व उससे आवरित कई सोराई दिखते हैं।

इस काट में धानी (receptacle) उदग्र रूप से कटती है अतः सेक्शन में मात्र दो सोराई दिखती हैं। हर सोरस इन्डूशियम द्वारा घिरा रहता है।

इस काट में सोरस की धानी के अन्तस्थ सिरों पर लघुबीजाणुधानी तथा बाकी हिस्से पर गुरुबीजाणुधानी पायी जाती है। धानी के ऊपरी सिरे पर जिलेटिनस रिंग नीचे वाली रिंग से कुछ बड़ी होती है।

इस काट में पृष्ठीय, पार्श्वीय, बीजाण्डासनीय पूल तथा शाखायें दिखती हैं।

उदग्र अनुदैर्घ्य परिच्छेद (Vertical longitudinal section)– इस परिच्छेद में सोराई अनुदैर्घ्य रूप से व्यवस्थित रहती है।


इसमें वृंत भी अनुदैर्घ्य रूप में कटता है। बाहरी भाग में भित्ति उपस्थित रहती हैं जो मोटी कोशिकाओं युक्त सरन्धी होती है।

मासीलिया के स्पोरोकार्प के V.T.S. में स्पोरोकार्प की भित्ति से आवरित कई सोरस दिखाई देते हैं।


इस काट में सोराई उदग्र रूप से कट जाते हैं तथा सभी सोराई एक पंक्ति में व्यवस्थित रहते हैं। प्रत्येक सोरस अपने एकनिष्ठ (individual) इन्डूशियम द्वारा घिरा रहता है।

इस काट में गुरुबीजाणुधानियां या लघुबीजाणुधानियां दिखाई देती हैं। सेक्शन के मध्य भाग से कटने पर गुरुबीजाणुधानियां तथा धानी (receptacle) के पास से गुजरने पर लघुबीजाणुधानियां दिखती हैं।

इस काट में वृन्त तथा पार्श्वीय (stalk and lateral) संवहन पूल दिखते हैं।




MARSILEA:
A SINGLE SPOROCARP



MARSILEA SPOROCARP H.L.S.

MARSILEA SPOROCARP V.T.S.



(A) V.L.S. OF SPOROCARP THROUGH MICROSPORANGIA

(B) V.L.S. OF SPOROCARP THROUGH MEGASPORANGIA

सिलेजिनीला का बांकु

उद्देश्य :- सिलेजिनीला के बांकु का अध्ययन

आवश्यक सामग्री :- नीडल, दाश, चिमटी, ब्लैंड सेप्रेनीन, गिलसरीन स्लाइड, कवर स्लिप, माइक्रोस्कोप आदि।

विधि :- सर्वप्रथम सिलेजिनीला का बांकु का अनुपस्थ काट ब्लैंड की सहायता से करते हैं।

→ काटे हुए अनुपस्थक्रम से सबसे पहले अनुपस्थ काट का चयन करते हैं।

→ चयनित अनुपस्थ काट की स्लाइड पर लिया जाता है और सेप्रेनीन की सहायता से अभिरंजित करते हैं।

→ सेप्रेनीन से अभिरंजित करने के बाद गिलसरीन की सहायता से माउंटिंग की जाती है।


→ अब कवर स्लिप लगाकर माइक्रोस्कोप से प्रेक्षण करते हैं।

बांकु :- सभी जातियों में जलद भाग व वर्णीभाग से पूर्णतया भिन्न होता है तथा ये बीजाणुपत्र के संघनन से प्रत्येक जलद भागवाट के सिरे पर बनता है और बांकु कहलाता है प्रत्येक बांकु $\frac{1}{2}$ इंच लम्बा व क्षीर्ष पर गोल, आघातकार व नुनदार होता है बांकु दो प्रकार के होते हैं।


समबीजाणुधानिक सांकु :- सी. ग्रेसिलिन तथा सी. एडो विरिमिल आदि जातिगो में सांकु पर केवल एक प्रकार के बीजाणुपर्ण, गुरुबीजाणुपर्ण आवा लघुबीजाणु पर्ण उपस्थित होते हैं।

विषमबीजाणुधानिक सांकु :- सांकु के अक्ष पर दो प्रकार के अवधि-लघु गुरुबीजाणु पर्ण मिलते हैं एवं सांकु पर लघु तथा गुरुबीजाणु पर्ण दोनों भिन्न - 2 प्रकार से लगे होते हैं इनका वितरण विभिन्न जातिगो में निम्न प्रकार से होता है सि - स्पेक्ट्रम - सांकु के आधारिय भाग पर गुरुबीजाणु पर्ण व ऊपर की ओर लघु बीजाणु पर्ण पाये जाते हैं।


सि. कोसियाना - अक्ष के आधार पर एक ही गुरुबीजाणु पर्ण होता है दोष सभी लघुबीजाणु पर्ण होते हैं सिलेप्पिनेला में एक ही सांकु में विषम बीजाणुओं की उपस्थिति विषम बीजाणुकता कहलानी है।




SELAGINELLA: STROBILUS, MEGASPORANGIUM, MICROSPORANGIUM




MICROSPORANGIUM



MICROSPORANGIUM



MEGASPORANGIUM



MEGASPORANGIUM

इक्वीसीटम बांकु का उदग्रकाट

उद्देश्य :- इक्वीसीटम के बांकु का उदग्र काट का अध्ययन

आवश्यक सामग्री :- नीडल, वृक्ष, चिमटी, ब्लैंड, सेप्रेनिन, गिलसरीन, स्लाइड कवर स्लिप, माइक्रोस्कोप आदि।

विधि :- सर्वप्रथम इक्वीसीटम के बांकु का उदग्रकाट ब्लैंड की सहायता से काटते हैं।

कटे हुए उदग्र काट को स्लाइड पर लिया जाता है उदग्र में से सबसे पतले उदग्र काट का चयन करते हैं।

→ चयनित उदग्र काट को स्लाइड पर लिया जाता है और सेप्रेनिन की सहायता से आभिरंजित करते हैं।


→ सेप्रेनिन से आभिरंजित करने के बाद गिलसरीन की सहायता से ओगिरा करते हैं।

→ सेप्रेनिन से आभिरंजित करने के बाद कवर स्लिप लगाकर माइक्रोस्कोप observation करते हैं।


बांकु की संरचना :- बांकु फलद शाखाओं की शीर्ष पर एकल विकसित होती है।

→ बांकु $\frac{1}{2}$ इंच में 2 इंच तक लम्बे होते हैं तथा इनका शीर्ष नुकीला त गोलकार होता है।

→ प्रत्येक बांकु में एक द्विप आक्ष होता है जिस पर बीजाणुधानी नर चक्रम में है। प्रत्येक चक्रम में उनकी संख्या 20 तक होती है।



***EQUISETUM*: L.S. CONE**



***EQUISETUM*: T.S. CONE**

इक्वीसीटम तने का अनुप्रस्थ काट
उद्देश्य $\Rightarrow$ इक्वीसीटम के तने का अध्ययन

आवश्यक सामग्री $\Rightarrow$ नीउल ब्रश चिमटी ब्लैंड सेपेनीन, ग्लिसरीन स्लाइड कवर स्लिप माइक्रोस्कोप आदि।

विधि $\Rightarrow$ सर्वप्रथम इक्वीसीटम के तने का अनुप्रस्थ काट ब्लैंड की सहायता से काटे हैं।
काटे हुए अनुप्रस्थ काट में से सबसे पहले पहले अनुप्रस्थ का चयन करते हैं।

अनुप्रस्थ काट को स्लाइड पर बिछा जाता है। और सेपेनीन की सहायता से अभिरंजित करते हैं।

सेपेनिन से अभिरंजित करने के बाद ग्लिसरीन की सहायता से माछिं की जाती हैं।

अब कवर स्लिप लगाकर माइक्रोस्कोप से निरीक्षण करते हैं।

संरचना $\Rightarrow$ इक्वीसीटम के वायवीय शरीर में अनेक अनुदैर्घ्य उभार अतः अनुप्रस्थ काट में इसकी बाहरी सतह लहरदार दिखाई देती है।

वायवीय शरीर की फी की अनुप्रस्थ काट में निम्न भाग दिखाई देते हैं।

बाह्य त्वचा $\Rightarrow$ (epidermis) यह केवल एक स्तरीय परत है इसकी कोशिका की बाह्य त्वचा के पार्श्व पर शिफिका की परत होती है। जिसके कारण स्तम्भ सुदृढ़ हो जाता है।

बाह्य त्वचा में अनेक रक्त पाये जाते हैं।

निचली परत की कोशिका द्वारा कोशिका तथा ऊपरी परत की कोशिका सहायक कोशिका बनती हैं।

त्वचा $\Rightarrow$ त्वचा की संरचना अपेक्षाकृत जटिल होती है। यह बाहरी तथा त्वचा आन्तरिक त्वचा में विभक्त होती है।


त्वचा (बाहरी) $\Rightarrow$ यह त्वचा दृढ़ता तथा क्लारीन काश्मा त्वचा में निर्मित होता है।

उभारी में इसकी संख्या अधिक होती है। जबकि त्वचा के नीचे एक ही स्तर होते हैं।


(त्वचा) आन्तरिक $\Rightarrow$ इक्वीलीटम की विभिन्न जातियों में अन्तस्थ त्वचा रंग के चारों ओर एक परत के रूप में पायी जाती है।

रम्भ $\Rightarrow$ अन्तस्थ त्वचा के भीतर पुरिन्काश्मा कोशिका की एक परत होती है। जिसे परिम्भ रम्भ में अनेक संवहन पुल होते हैं। जो केन्द्रकी पित के चारों ओर वलय में स्थित होते हैं।

पिन्ध $\Rightarrow$ वायवीय उरोह के पूर्व केन्द्रिका भाग में एक गुहा होती है।



EQUISETUM: T.S. AERIAL STEM (OUTLINE)



EQUISETUM: T.S. AERIAL STEM (CELLULAR)

सिलेजिनेला तने का अनुप्रस्थ काट

उद्देश्य ⇒ सिलेजिनेला के तने का अध्ययन

आवश्यक सामग्री ⇒ निजल बुश चिमटी ब्लैंड सेपेनिन ग्लिसरीन स्लाइड कवर स्लिप माइक्रोस्कोप आदि

विधि ⇒ सर्वप्रथम सिलेजिनेला के तने का अनुप्रस्थ काट ब्लैंड की सहायता से काटे हैं।

काटे हुए अनुप्रस्थ काट में से सबसे पहले अनुप्रस्थ काट का चयन करते हैं।

चयनित अनुप्रस्थ काट की स्लाइड पर लिया जाता है और सेपेनिन की सहायता से अभिरंजित करते हैं।

सेपेनिन से अभिरंजित करने के बाद ग्लिसरीन की सहायता से माउंटिंग की जाती है।

अब कवर स्लिप लगाकर माइक्रोस्कोप से प्रेक्षण करते हैं।

संरचना ⇒ तने के अनुप्रस्थ काट में बाह्यत्वचा बल्कुट और रम्भा विभेदित होती हैं।

बाह्यत्वचा ⇒ यह सबसे बाहरी एक कोशिकीय मीठी परत से ढकी रहती है।

बाह्यत्वचा में रम्भा तथा किसी प्रकार के रीम नहीं पाए जाते हैं।

Color ⇒ अधिकतर जातियों में लक्ष्य परिरंकाश कौशिकों से बना होता है।

परिरंकाश द्वारा सृष्ट लक्ष्य रूप में व्यवस्थित होती है। तथा इनमें अन्तःकौशिक स्थान नहीं पाये जाते हैं।

कुछ जातियों में कभी कभी लक्ष्य पूर्णतया द्वीतक कौशिकों से बना होता है।


Style ⇒

तने के केन्द्रिक भाग की स्थित लक्ष्य के बीच में स्थित विशेष उकार के लक्षण अन्तःवर्णीय द्वारा पाये जाती हैं।


यह कौशिकों अरिथ रूप में दीर्घित होती है। तथा इन्हे टेबीवर्णीय कहते हैं। तथा इन द्वारा के बीच बड़े - छोटे अन्तःकौशिकीय स्थान पाये जाते हैं।

प्रत्येक रंग एक सुस्पष्ट एक स्तरीय परिरंभ से आवृत होता है।


जिन जातियों में केवल एक परिरंभ पाया जाता है। उनका श्रृंखला द्वि आदि शरूप तथा बाह्य आदिदास्त होता है। परन्तु जब रंभों की संख्या से अधिक हो जाती है। तो प्रत्येक रंग का श्रृंखला मध्यम या व्युत्क्रम होता है।



SELAGINALLA: T.S. STEM OUTLINE



SELAGINALLA: T.S. RHIZOPHORE



SELAGINALLA: T.S. STEM

रायनिया का वर्गीकरण (Classification of Rhynia)

टेरिडोफायटा

- (i) पादप जड़, तने व पत्तियों में विभेदित,
- (ii) स्पष्ट संवहन पूल उपस्थित

वर्ग : साइलोफायटोप्सिडा

क्लास : साइलोफायटा

- (i) इसके अन्तर्गत साइलोफायटा के विलुप्त प्रतिनिधि आते हैं।
- (ii) इनके जीवित प्रतिनिधि साइलोटोप्सिडा में सम्मिलित हैं।

गण : साइलोफायटेल्स

- (i) पादप मूलरहित द्विभाजीशाखित।
- (ii) बीजाणुदभिद पादप, प्ररोह भूमिगत प्रकन्द व वायवीय भाग में विभेदित।
- (iii) बीजाणुधानियाँ शीर्ष पर अथवा पार्वीय
- (iv) संवहन तंत्र प्रोटोस्टील
- (v) युग्मकोदभिद अज्ञात

कुल : रायनिएसी

- (i) वायवीय भाग पत्तियों रहित (leafless aerial shoot)
- (ii) मूलांग (rhizoids) एककोशिकीय व समूहों में प्रकन्द के ऊपर उपस्थित।

वंश : रायनिया

- (i) बीजाणुधानियों में स्तंभिका (columella) का अभाव।
- (ii) पादप समबीजाणुक।

आद्य पादप रायनिया (Primitive Plant Rhynia)

सायलोफाइटोन का सबसे ज्ञात पादप रायनिया है। रायनिया डिवोनियन काल का पौधा है जिसका पता, सर्वप्रथम किड्स्टन व लैंग ने स्काटलैण्ड से लगाया था।


इन्होंने स्काटलैण्ड में अबर्दीनशायर (Aberdeen shire) में स्थित रायनी क्षेत्र के रायनिया चर्ट बेड से इस पादप के जीवाश्म प्राप्त किये थे।

इन वैज्ञानिकों के मतानुसार यह पौधे ज्वालामुखी के पास पीटमय स्थानों में उगा करते थे। वहाँ के वातावरण में ज्वालामुखी के कारण सल्फर की वाष्प उपस्थित होती थी। भूमि में अम्लता की मात्रा भी अधिक होती थी।

अभी तक केवल दो जातियों की ही खोज संभव हो सकी है, जो आकार (size) के आधार पर अलग की गयी हैं।

बीजाणुदभिद पादप की आकारिकी अत्यन्त सरल थी। बीजाणुदभिद पादप में मूल व पत्तियाँ अनुपस्थित थीं। पादप भूमिगत प्रकन्द तथा वायवीय प्ररोह में विभाजित था।

तना द्विभाजी रूप में शाखित व तने में ठोसरंभीय संवहन स्ट्रेण्ड उपस्थित था। एकल बीजाणुधानी शाखा के शीर्ष पर उपस्थित थी।



RECONSTRUCTION OF RHYNIA PLANT (A) *RHYNIA GWANE VAUGHANI*. (B) *R. MAJOR*

(Reproduction)

पाइनस में कायिक जनन नहीं पाया जाता है अतः पाइनस सिर्फ लैंगिक जनन द्वारा ही वंश की वृद्धि करता है। यह **उभयलिंगाश्रयी** (monoecious) होता है अर्थात् नर व मादा शंकु एक ही वृक्ष पर किन्तु अलग-अलग शाखाओं पर उत्पन्न होते हैं। नर शंकु पादप के आधारीय (lower) तथा मादा शंकु पादप की ऊपरी (upper) शाखाओं पर लगते हैं।

नर शंकु (Male Cone)

वर्ष के आरम्भ में लम्बी शाखाओं पर हल्के भूरे रंग के शल्क पत्रों की कक्ष में बौनी शाखा के स्थान पर नर शंकु समूह (cluster) में लगते हैं अर्थात् यह बौनी शाखा को विस्थापित करते हैं। समूह में इनकी संख्या 15 तक हो सकती है। प्रत्येक अण्डाकार शंकु कुछ सहपत्रों द्वारा घिरा रहता है। पकने से पहले पीले हरे व पकने के बाद भूरे लाल रंग के होते हैं। इनकी लम्बाई 1.25 सेमी. तक होती है। नर शंकु—मादा शंकु से पहले वृक्ष पर उत्पन्न होते हैं।

लघुबीजाणुपर्ण (Microsporophyll)

शंकु में एक केन्द्रीय अक्ष होता है जिस पर सर्पिल क्रम में 60 से 135 तक लघुबीजाणुपर्ण लगे रहते हैं। यह आधार व शीर्ष पर छोटे तथा बन्ध्य (sterile) व मध्य में बड़े व उर्वर (fertile) होते हैं। इसे तीन भागों में विभक्त किया जाता है।


(i) **वृन्त (Stalk):**—इसके द्वारा यह संवहन के लिये अक्ष से जुड़ा रहता है।

(ii) **मध्य उर्वर भाग (Middle fertile part):**—यह त्रिकोना भाग होता है। इसकी अपाक्ष सतह पर दो लघुबीजाणुधानियाँ लगी रहती है।


(iii) **ऊपरी मुक्त सिरा:**—यह कुछ नुकीला व ऊपर की ओर मुड़ा रहता है।

लघुबीजाणु (Microspore)

पाइनस में लघुबीजाणु चतुष्क रूप में लघुबीजाणुधानी में विन्यासित रहते हैं। प्रत्येक बीजाणु में दो भित्तियाँ पायी जाती है:— बाहरी क्यूटिनयुक्त कैप्सा अथवा बाह्य चोल। आंतरिक सैल्यूलोज युक्त कैम्प्यूला अथवा आंतरिक चोल। प्रत्येक लघुबीजाणु में एक बड़ा केन्द्रक (nucleus) व सघन जीवद्रव्य उपस्थित होता है। कुछ समय बाद कैप्सा लघुबीजाणु के दो विपरीत भागों पर अतिवृद्धि करके सुस्पष्ट पक्षों (wings) का निर्माण कर लेती है।



PINUS: CLUSTER OF MALE CONES



PINUS: (A) L.S. MALE CONE (B) MICROSPOROPHYLL

साइकल पण्डि का अनुप्रस्थ काट

उद्देश्य $\Rightarrow$ साइकल के पण्डि का अध्ययन

आवश्यक सामग्री $\Rightarrow$ साइकल के पण्डि के अनुप्रस्थ काट में निम्न द्वारा चिह्नीत ब्लैंड सेउनिन ग्लिसरीन स्लाइड कवर स्लिप माइक्रोस्कोप आदि का उपयोग करते हैं।

विधि $\Rightarrow$ सर्वप्रथम साइकल के पण्डि का अनुप्रस्थ काट ब्लैंड की सहायता से काटते हैं।

कार्टे हुए अनुप्रस्थ काट में से सबसे पहले अनुप्रस्थ काट का चयन करते हैं।

चयनित अनुप्रस्थ काट में से को स्लाइड पर लिया जाता है। और सेउनिन की सहायता से अभिरंजित करते हैं।

सेउनिन से अभिरंजित करने पर बाद ग्लिसरीन की सहायता से गाड़ियां की जाती हैं।

अब कवर स्लिप लगाकर माइक्रोस्कोप से निरीक्षण करते हैं।

पण्डि का अनुप्रस्थ काट $\Rightarrow$ साइकल के पण्डि के काट की रूपरेखा उल्टे पक्षी जैसी दिखाने वाली है।

पण्डि के अनुप्रस्थ काट विवरण के निम्न प्रकार हैं। $\Rightarrow$

बाह्य त्वचा $\Rightarrow$ मनुष्य की कोशिकाओं की एकल स्तरीय ऊपरी व निचली त्वचा मिलती है। निचली बाह्य त्वचा में हंसों हुए रक्त पाये जाते हैं।

बाह्य त्वचा में पर कोशिकाओं की बाह्यमिति पर क्यूटिकल की मोटी परत उपस्थित रहती है।

अधःत्वचा $\Rightarrow$ यह दृढ़त्वकी द्वारा निर्मित भाग है जो मध्यसिरा क्षेत्र में बहुस्तरीय तथा पतलपत्रक क्षेत्र में सामान्यतः दो प्रकार का होता है।

पर्ण मध्योत्तक $\Rightarrow$ यह ऊपरी अधःत्वचा व नीचली बाह्य त्वचा के मध्य का क्षेत्र है। यह प्राकृतिक वृद्धाचार पर्ण की तरह खम्भ उत्तक तथा स्पंजी मुद्रितक में विभक्त होता है।

खम्भ उत्तक $\Rightarrow$ यह ऊपरी अधःत्वचा के नीचे उपस्थित एक परतीय क्रमशः प्रकार का संश्लेषी क्षेत्र है। खम्भ उत्तक मध्य सिरा क्षेत्र में सतत रहता है।


स्पंजी उत्तक $\Rightarrow$ यह निचली बाह्य त्वचा के कारण परस सहायक संचरण उत्तक तथा बाह्यत्वचा के मध्य का वलनिकाश्मा से बना क्षेत्र है।

संवलन पूल $\Rightarrow$ संवलन पूल संयुक्त संपार्श्विक तथा सभी प्रकार के मिलते हैं।


संवलन पूल द्विवाचक प्रकार का होता है। जिसमें त्रिकोना अग्रिकेंद्रकी जारलम का पार्श्वीय अपकेंद्रीय जारलम समूह उपस्थित रहते हैं।

जारलम ऊपरी अक्षिर्म की ओर जबकि फ्लोयम निचले अक्षिर्म की ओर स्थित जारलम व फ्लोयम के बीच उपस्थित होता है।

संचरण उत्तक $\Rightarrow$ मध्यसिरा में स्थित संवलन पूल के दोनो ओर बाहिनिका जैसे कोशिकाओं का समूह संचरण उत्तक के मध्य लम्बी कहलाता है। खम्भ उत्तक स्पंजी उत्तक के मध्य लम्बी गतिगुक्त रंगहीन कोशिकाओं की 8 या 9 परतें मिलती हैं। जो द्वितीयक संचरण उत्तक अथवा सहायक संस्यरण उत्तक कहलाते हैं।



CYCAS: T.S. OF LEAFLET (OUTLINE)



CYCAS: T.S. OF LEAFLET (CELLULAR)

सामान्य मूल का अनुप्रस्थ काट (T.S. of Normal Root)

मूलीय त्वचा (Epiblema):— यह एक स्तरीय और पतली भित्ति वाली कोशिकाओं की बनी होती है। कुछ कोशिकाओं में से मूल रोम निकले होते हैं।

वल्कुट (Cortex):— यह मृदुतकीय कोशिकाओं की बहुस्तरीय संरचना होती है जिसमें मंड व टैनिन कोशिकाएँ तथा श्लेष्मा नलिकाएँ होती हैं।

अन्तश्त्वचा (Endodermis):— यह एक स्तरीय ढोलकाकार (barrel shaped) कोशिकाओं की बनी होती है।

रंभ (Stele):— परिरंभ कई स्तरीय मृदुतकीय कोशिकाओं का बना होता है।

संवहनपूल अरीय द्विआदिदारुक (diarch) से चतुरादिदारुक (tetrach) व बाह्य आदिदारुक (exarch) होते हैं।

जायलम में वाहिकाएँ अनुपस्थित होती हैं, प्रोटोजायलम में सर्पिलाकार व मेटाजायलम में परिवेशित गर्त तथा सोपानवत स्थूलन पाया जाता है।

फ्लोएम में सहकोशिकाएँ अनुपस्थित होती हैं केवल चालनी नलिकाएँ व फ्लोएम मृदुतक पाया जाता है।

मज्जा (Pith):— सामान्य मूल में मज्जा अनुपस्थित अथवा अल्प विकसित होती है।

द्वितीयक वृद्धि (Secondary growth)


इसमें द्वितीयक वृद्धि द्विबीजपत्री जड़ के समान ही होती है। जायलम और फ्लोएम के एकांतरित पूलों के मध्य में मृदुतक कोशिकाओं की जो पर्त उपस्थित होती है वह रूपांतरित होकर कैम्बियम का निर्माण करती है।

इसकी क्रियाशीलता के फलस्वरूप जड़ों में द्वितीयक वृद्धि आरम्भ हो जाती है। द्वितीयक जायलम अंदर की ओर व फ्लोएम बाहर की ओर बनता है।


द्वितीयक पूल संयुक्त, संपार्श्विक होते हैं। परिपक्व मूल में दो कॉर्क कैम्बियम की पर्तें होती हैं। पहली बाह्यत्वचा के नीचे बनती है व दूसरी परिरंभ से निर्मित होती है।

बाह्यत्वचा से बनने वाली कॉर्क कैम्बियम अल्पजीवी होती है। परिरंभ से बनने वाली कॉर्क कैम्बियम की कोशिकाएँ ऊपर की मोटी भित्ति वाली कॉर्क की कोशिकाएँ व अन्दर की ओर बहुकोशिकीय तथा मृदुतकीय द्वितीयक वल्कुट का निर्माण करती हैं।

मज्जा रश्मियाँ (Medullary rays):— मज्जा संकरी मृदुतकीय कोशिकाओं की बनी होती है।



CYCAS: T.S. NORMAL ROOT (OUTLINE)



CYCAS: T.S. NORMAL ROOT (CELLULAR)

प्रवाल मूल का अनुप्रस्थ काट (T.S of Coralloid Root)

अनुप्रस्थ काट में यह सामान्य द्विबीजपत्री मूल के समान होती है, किन्तु इसमें वल्कुट काफी विकसित व तीन भागों में विभाजित रहता है।

मूलीयत्वचा (Epiblema):— एकस्तरित मृदुतकीय कोशिकाओं की बनी होती है।

वल्कुट (Cortex): यह तीन भागों में विभाजित रहता है—

बाहरी वल्कुट (Outer cortex):— यह बहुस्तरित टैनिनयुक्त मृदुतकीय कोशिकाओं का बना होता है।

मध्य वल्कुट (Middle cortex):— इसकी कोशिकाएँ अपेक्षाकृत लम्बी होती हैं। इनमें नील हरित शैवाल एनाबीना, नॉस्टॉक तथा जीवाणु, ऐजेटोबैक्टर तथा स्यूडोमोनास पाये जाते हैं।

अनावृतबीजी

आंतरिक वल्कुट (Inner cortex) :- इसकी कोशिकाएँ भी बाहरी वल्कुट के समान बहुस्तरीय व टैनिन युक्त होती हैं।

रंभ (Stele) :- बहुस्तरीय परिरंभ मृदुतकीय कोशिकाओं का बना होता है। संवहन पूल अरीय (radial), त्रिआदिदारुक (triarch) व बहिरादिदारुक (exarch) होते हैं।

मज्जा (Pith) :- प्रवाल मूल में मज्जा अल्पविकसित अथवा अनुपस्थित होती है। द्वितीयक वृद्धि (secondary growth) प्रायः अनुपस्थित होती है।

पत्तियाँ (Leaves)

सायकस में पत्तियाँ द्विरूपी (dimorphic) होती हैं— शल्क पर्ण, सामान्य पर्ण। यह चक्र में एक दूसरे से एकान्तर क्रम में लगी रहती हैं। हर वर्ष पत्तियों का एक चक्र तने के शीर्ष पर लगता है।

शल्क पत्र (Scaly Leaves) :- यह छोटी, भूरी, रोमयुक्त, 5 से 10 से.मी. लम्बी आधार पर चौड़ी और ऊपर की तरफ नुकीली, सरल व दीर्घस्थायी होती हैं।

इन पत्तियों का कार्य नई कलिकाओं व तने को सुरक्षा प्रदान करना है। इनकी संख्या सामान्य पत्तियों की अपेक्षा काफी अधिक होती है। इन्हें कैटाफिल भी कहते हैं।

सामान्य पर्ण (Foliage leaves) :- यह सदाहरित होती हैं और आरंभिक अवस्था में कुण्डलित किसलय विन्यास (circinate vernation) प्रदर्शित करती हैं।

सामान्य पर्ण रोमों द्वारा ढकी, संयुक्त, पिच्छाकार (compound pinnate) व एक से तीन मीटर तक लम्बी हो सकती है। इसके मुख्य तीन भाग होते हैं— पर्णवृन्त, पिच्छाक्ष, पर्णक।


पर्णवृन्त (Petiole) :- यह पिच्छाक्ष (rachis) का सबसे आधारीय भाग होता है जिसके द्वारा यह तने से जुड़ा रहता है। इस पर पर्णिकाएँ कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं।

पिच्छाक्ष (Rachis) :- यह उभयोत्तल (biconvex), मोटा कड़ा व चमड़िल होता है जिस पर बहुसंख्यक पर्णिकाएँ लगी रहती हैं।


पर्णक (Leaflets) :- रेकिस पर उपस्थित पर्णकों की संख्या आरम्भ में कम होती है किन्तु पत्तियों के परिपक्व होने के साथ-साथ यह बढ़ती रहती है।

इनमें एक निश्चित अशाखित मध्य शिरा पायी जाती है। पार्श्व शिराओं की आपूर्ति के लिए पर्णक में एक विशेष प्रकार का संचरण ऊतक (transfusion tissue) पाया जाता है।

पर्णकों का आकार संकरा, रेखीय सूच्याकार अथवा भालाकार होता है। यह मजबूत, चिकने, अवृन्त, चमड़िल (leathery) तथा उपसम्मुख रूप से व्यवस्थित रहते हैं। पर्ण के किनारों का वर्गिकीय महत्त्व (taxonomic value) है। यह मुड़े हुये हो सकते हैं जैसे सायकस रेव्यूलेटा (*Cycas revoluta*) व सायकस सर्सिनेलिस (*Cycas circinalis*) में सीधे पाये जाते हैं।



CYCAS: T.S. COROLLOID ROOT (OUTLINE)



CYCAS: T.S. COROLLOID ROOT (CELLULAR)

इफिडा तने का अनुप्रस्थ काट

उद्देश्य ⇒ इफिडा के तने का अध्ययन

आवश्यक सामग्री ⇒ नीडल ग्रेश चिमटी ब्लैंड सेज्मिन ग्लिसरीन स्लाइड कवर स्लिप माइक्रोस्कोप आदि।

विधि ⇒ सर्वप्रथम इफिडा के तने का अध्ययन अनुप्रस्थ काट ब्लैंड की सहायता से काटते हैं।

कटे हुए अनुप्रस्थ काट में से सबसे पहले अनुप्रस्थ काट का चयन करते हैं।

चयनित अनुप्रस्थ काट को स्लाइड पर लिया जाता है और सेज्मिन की सहायता से अभिरंजित करते हैं।

सेज्मिन से अभिरंजित करने के बाद ग्लिसरीन की सहायता से माउंटिंग की जाती है।

अब कवर स्लिप लगाकर माइक्रोस्कोप से प्रेक्षण करते हैं।

तने का अनुप्रस्थ काट ⇒ तने का अनुप्रस्थ काट बास त्वचा वल्कुट तथा प्राथमिक व द्वितीयक ऊतकों को दर्शाता है।

बास त्वचा ⇒ यह युवा तने के समान ब्युक्लिड युक्त मुदुतकी कोशिकाओं की एक परत है जहाँ खमंच वाले भाग से रस रन्ध्रा पाये जाते हैं।

अथः त्वचा ⇒ दृढ़ीकृत बहुपरतीय यह भाग उभार के नीचे प्रायः त्रिकोणी समूह के रूप में मिलता है।

वल्कुट ⇒ वल्कुट दो भागों में बँट रहा है।

बाह्य वल्कुट $\Rightarrow$ खम्भ ऊल्कुट द्वारा निर्मित 2-3 स्तरीय इस भाग में बहुत लंबे जड़ भाग में मिलता है। अतः इफ्रिजा का तना हरा तथा संश्लेषी होती है।


आन्तरिक वल्कुट $\Rightarrow$ बेलरीक्यूलास्ट युक्त गोल अथवा अण्डाकार पतली त्रिलि युक्त कोशिकाओं वाले इस मुदुतकीय भाग में अन्तर कोशिकीय मिलते हैं।

अन्तःचर्म $\Rightarrow$ दीर्घाकार कोशिकाओं द्वारा निर्मित वल्कुट की सबसे अन्दर की परत अन्तःचर्म कहलाती है।


परिरम्भ $\Rightarrow$ एक मुदुतकी परत जो अस्पष्ट होती है।

संवहनी भाग $\Rightarrow$ इफ्रिजा में पाई संवहन पूल मिलते हैं। संवहन पूल संयुक्त संपार्श्विक वही अन्त आदिदारु होते हैं। संवहन पूल छोटे तथा बड़े व एकान्तर क्रम में व्यवस्थित होते हैं।

मज्जा $\Rightarrow$ यह अन्तकोशिकीय स्थानी युक्त मुदुतकी केन्द्रीय भाग है।



EPHEDRA: T.S. YOUNG STEM (OUTLINE)



EPHEDRA: T.S. YOUNG STEM (CELLULAR)

पाइनस नीडल का अनुप्रस्थ काट

उद्देश्य $\Rightarrow$ पाइनस में नीडल का अध्ययन

आवश्यक सामग्री $\Rightarrow$ नीडल प्रेश चिमटी ब्लैंड सैप्टेनीन ग्लिसरीन स्लाइड कवर स्लिप माइक्रोस्कोप आदि।

विधि $\Rightarrow$ सर्वप्रथम इफ्रिका के बीच नीडल का अनुप्रस्थ काट ब्लैंड की सहायता से काटते हैं।

कटे हुए अनुप्रस्थ काट में से सबसे पहले अनुप्रस्थ काट का चयन करते हैं।

चयनित अनुप्रस्थ काट को स्लाइड पर लिया जाता है। और सैप्टेनीन की सहायता से अभिरंजित करते हैं।

सैप्टेनीन से अभिरंजित करने के बाद ग्लिसरीन की सहायता से माउंटिंग की जाती है।

अब कवर स्लिप लगाकर माइक्रोस्कोप से प्रेक्षण करते हैं।

पर्ण अधवा नीडल का अनुप्रस्थ काट $\Rightarrow$ पाइनस की विभिन्न जातियों में पर्ण में अलग-र संख्या में पर्ण अधवा नीडल मिलती है। उदाहरण के तौर पर पाइनस मीनाफ्रिला के पर्ण स्तर में तीन पर्ण मिलती है।

तीन पर्ण युक्त पर्ण स्तर के अनुप्रस्थ काट में निम्न महत्वपूर्ण बिन्दु हैं।

बाह्य त्वचा $\Rightarrow$ यह मोटी उपत्वचा के आवरण से ढकी मोटी भित्ति वाली एक स्तरीय परत है जिस पर बड़े रन्ध्र पाये जाते हैं।

अष्टचर्म (Ashtacharm) यह दृढ़त्वकी दो तीन कौशिकीय मोटा भाग है जो कौणीय भागों पर अधिक मोटा होता है।

पर्णमध्योत्क ⇒ यह अतिमोदित पतली मिलि युक्त बहुभुजी मुद्रुतकी कौशिकाओं से बना होता है। पाइनस के पर्ण मध्योत्क कौणी पर रेजीन नलिकाएँ उपस्थित होती हैं।


अन्तश्चर्म ⇒ दीलकाकार कौशिकाओं से बनी रस एकल परत की अरीय तथा स्पर्श रेखीय मिलियों पर उ आकृति का संघटन पाया जाता है।

परिरम्भ ⇒ अन्तश्चर्मा के नीचे तथा संवहन पूलों के चारों ओर पाया जाने वाला ऊतक बहुस्तरीय परिरम्भ अथवा संचरण कहलाता है।

संवहन पूल ⇒ प्रत्येक पर्ण दो संवहन पूल स्थित होते हैं। अपवाद स्वरूप पाइनस स्प्रोक्स जाति में मात्र एक ही संवहन पूल मिलता है।

संवहन पूल आकृति के मोटी मिलि युक्त संचरण ऊतक द्वारा अलग अलग करते हैं।

प्रत्येक संवहन पूल संयुक्त संपाशविके तथा पथी उकार के होते हैं। संवहन पूल का प्रोटीनोइलम उच्च फ्लोयम अवर सतह पर स्थित रहते हैं।



PINUS: T.S. NEEDLE (CELLULAR)