




Index

Sr. No.	Name of the Experiment	Page No.	Date of Experiment	Date of Submission	Remarks
1.	निक्ल डाई मेथिल ग्लाइऑक्सीम संकुल $[Ni(CH_3)_2]$				
2.	कोपर टेट्रा ऐमीन संकुल को बनाना। $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$				
3.	पोटैशियम ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट आयन। $K_3[Fe(C_2O_4)_3]$				
4.	P-नाइट्रो ऐसीटेसिटेट का ऐसीटेनीलाइड से बनना।				
5.	P-क्रोमो ऐसीटेसिटेट का ऐसीटेनीलाइड से बनना।				
6.	कार्बनिक यौगिक आयोडोफार्म का ऐथेनॉल से बनना।				
7.	कार्बनिक यौगिक 2,4,6-ट्राईक्रोमो फिनॉल को फिनॉल से बनाना				
8.	फिनॉल जल निकास के पारस्परिक विलेयता वक्र से आलोचित कर जल निकास के लिए क्रांतिक ताप तथा जल पर विलयन का अध्ययन निर्धारित करना।				

★ रासायनिक अभिक्रिया :-



निकल (II) डाई मेथिल ग्लाइऑक्सीम संकुल

आकृति (ज्यामिति) :- वर्गाकार समतलीय

रंग - चमकीला गुलाबी

संकरण - dsp^2

Expt. No. _____

Date _____

Page No. 2

अब इसमें अमोनिया विलयन मिलाते हैं, जब तक कि विलयन लाल से पीले रंग का न हो जाये।

70 - 80 °C तक (लगभग 10 मिनट) अथवा DMG विलयन मिलाते हैं।

- अब अमोनिया विलयन अमोनिया की गंध माने तक मिलाते हैं। अतः हमें $[\text{Ni}(\text{DMG})_2]$ का चमकीला गुलाबी रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है।

- जल उष्मक पर 30 min. तक विलयन को गर्म करते हैं।

- जल उष्मक पर से हटाकर विलयन को एक बाल नहने देते हैं। फिर अवक्षेप को छान लेते हैं।

- गरम जल से धोते हैं। अवक्षेप को सुखा लेते हैं। अतः उसका अवक्षेप प्राप्त होता है।

★ परिणाम (Result) :-
 अवक्षेप -
 रंग - गुलाबी

★ सावधानियाँ (Precautions) :-

1. इस प्रयोग में काम में माने वाले रसायन को उष्मक से दूर रखा जाना है, ताकि प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की सति न हो पड़े।

2. किसी भी रसायन की मात्रा को बीकर में सापेक्षानी पूर्वक लिखा गया है, भंडारित बीकर के मध्य में डाला जाता है, तबिले कसरी लखी सही मात्रा में है।
3. अभिक्रिया में प्रयुक्त एल्कोहल ज्वलनशील होता है, इसलिए उसे सीधे उल्ला के संपर्क से दूर रखना चाहिए।

Experiment - 2

★ उद्देश्य (Object):— अकार्बनिक यौगिक कॉपर टेट्रा एमीन संकुल $[Cu(NH_3)_4SO_4]$ या टेट्रा एमीन कॉपर(II) सल्फेट का बनना।

★ आवश्यक सामग्री :-


(a) रसायन (Chemical) — कॉपर सल्फेट ($CuSO_4$)
अमोनिया लिक्विड या अमोनिया विलयन, एल्फे एस (C_2H_5OH)

(b) उपकरण (Apparatus) — बीकर, ग्लास की छड़, ग्लास उल्लेख, कॉनिकल फ्लास्क, फिल्टर पेपर, डीप बर्नर।

★ सिद्धांत (Theory) :- कॉपर सल्फेट विलयन में अमोनिया मिलाने पर टेट्रा एमीन कॉपर सल्फेट बनता है। बंधुषिक हाइड्रोक्साइड जो कि अवक्षेप के रूप में है अमोनिया के माध्यम में घुलकर गहरा नीला रंग देता है।

★ विधि (Procedure) :- कॉपर सल्फेट के घूर्ण को एक बीकर में लेकर

★ रासायनिक अभिक्रिया



टेट्रा एममीन कॉपर (II) आयन

ज्यामिती - वर्ग समतलीय

संकरण - sp^2

रंग - गहरा नीला

Expt. No. _____

Date _____

Page No. 5

- जल की न्यूनतम मात्रा में विलेय करते हैं।
- इसमें अमोनिया लेकर विलयन को धीरे-धीरे कंचड़ी द्रव से लगातार दिलाते हुए मिलाते हैं, जिससे पहले क्युबिक हाइड्रोक्साइड अ नीला अवक्षेप आता है।
- इसमें और अधिक अमोनिया अवक्षेप के विलेय होने पर गहरा नीला विलयन होने तक, अमोनिया की गंध आने तक मिलाते हैं।
- अब इस विलयन में एस्कोटल को धीरे-धीरे विलयन को लगातार दिलाते हुए जलते हैं।
- तब पर्याप्त बीकर में 10-15 min. तक जल उबालकर 60-70°C तक गर्म करते हैं। बीकर में छंटा करने पर इसमें बुई के आकार के नीले रंग के क्रिस्टल अलग हो जाते हैं, इन्हें फिल्टर पेपर से बुझाकर अलग कर लेते हैं।

★ परिणाम (Result):-
 लाल - 1
 रंग - गहरा नीला

★ सावधानियाँ (Precautions):-

1. अभिक्रिया में प्रयुक्त एस्कोटल ज्वलनशील होता है, इसलिए इसे बिचोरे तेल के संपर्क से दूर रखना चाहिए।

निष्कर्ष

Teacher's Signature _____

2. कॉपर सल्फेट के घूर्ण को कम से कम पानी में घोलना चाहिए।

3. कॉपर सल्फेट के विलयन में अमोनिया लीकुर विलयन को धीरे-धीरे मिलाना चाहिए ताकि ठोस निकल आये।

4. किसी भी वसायन की ली गई मात्रा को बीकर के माध्य में सावधानीपूर्वक रखना चाहिए ताकि लॉस्ट अच्छी हो।

Experiment - 3

★ उद्देश्य (Object) :- अकार्बनिक ऑर्गेनिक पोटेसियम डाई ऑक्सीलेटो फेरैट (II) तैयार करना $K_2 [Fe(C_2O_4)_2]$

★ आवश्यक सामग्री




(a) रसायन (Chemical) :- फेरिक क्लोराइड ($FeCl_3$), पोटेसियम हाइड्रॉक्साइड (KOH), ऑक्सैलिक अम्ल ($(COOH)_2$)

(b) उपकरण (Apparatus) :- बीकर, ऑनिकल फ्लास्क, काँच की छड़, बर्नर, फिल्टर पेपर, शीप, चायना डिश, ग्लास, स्पेचुला ।

★ सिद्धांत (Theory) :- जलघोषित फेरिक ऑक्साइड पर पोटेसियम ऑक्सीलेट की अभिक्रिया से पोटेसियम डाई ऑक्सीलेटो फेरैट (II) $K_2 [Fe(C_2O_4)_2]$ बनता है।

★ विधि (Procedure) :- सर्वप्रथम फेरिक क्लोराइड को पानी में घोला है, जो प्रकार द्वारा बीकर में पोटेसियम हाइड्रॉक्साइड को जल में घोला है।

★ रासायनिक अभिक्रिया :-



ज्यामिति - अष्टफलकीय

संकरण - $d^2 sp^2$

रंग - हरे क्रिस्टल

Expt. No. _____

Date _____
Page No. 8

फेरिक क्लोराइड के विलयन में पोटेशियम ट्राइऑक्साइडो फेरैट विलयन थोड़ा-थोड़ा करके मिलाते हैं। हमसे फेरिक ट्राइऑक्साइडो फेरैट $[\text{Fe}(\text{OH})_3]$ अवक्षेप प्राप्त होता है। उसे मुनकर ठीक इसी छानकर अच्छी तरह गर्म पानी से धोते हैं।

- पोटेशियम ट्राइऑक्साइड के पैलेट मिलाते हैं जिससे पोटेशियम ऑक्साइड विलयन बन जाता है। हम विलयन को कौंच की छड़ से अच्छी तरह से हिलाते हुए मिलाते हैं जिससे एक हरा विलयन प्राप्त होता है।
- विलयन को छानकर निस्पंद (filtrate) को गिलास की प्याली में जल उष्मक पर सांठित करते हैं,
- पोटेशियम फेरिक ऑक्साइड के हरे क्रिस्टल प्राप्त होते हैं जिन्हें पहले ठंडे पानी, फिर एल्कोहल से धोकर सांठित में बहाकर सुखक कर लेते हैं।

★ परिणाम (Result) :-

लावली - 10
रंग - हरे-रंग के क्रिस्टल

★ सावधानियाँ (Precautions) :-

1. अभिक्रिया में प्रयुक्त एल्कोहल ज्वलनशील होता है इसलिए उसे सांठित ही उष्मक के संपर्ध से दूर रखना चाहिए।

2. किसी भी वसायन की ली गई मात्रा को कीकट के मध्य में आवश्यकपूर्वक डालना चाहिए, ताकि लाली अच्छी हो।

3. फेरिक क्लोराइड वातावरण में तैल डिया कर लेता है, अतः उसे खुले वातावरण के संपर्क से बचना चाहिए।

Experiment - 4

★ उद्देश्य (Object):- कार्बनिक यांत्रिक p-नाइट्रो ऐसीटोनिलमाइड
अ ऐसीटोनिलमाइड से बनना

★ आवश्यक सामग्री
(a) रासायन (Chemical):-


ऐसीटोनिलमाइड
नलोसिल ऐसीटिक अम्ल
कार्ब सल्फ्यूरिक अम्ल
कार्ब नाइट्रिक अम्ल
बर्फ, नमक

(b) उपकरण (Apparatus):- फ्लास्क, बीकर, थर्मामीटर, परखनली


★ सिद्धांत (Theory):- ऐसीटोनिलमाइड का नाइट्रीकरण करने पर
मुख्य रूप से p-नाइट्रोऐसीटोनिलमाइड तथा कम
मात्रा में o-नाइट्रोऐसीटोनिलमाइड का मिश्रण बनता है।

★ विधि (Procedure):- सर्वप्रथम बीकर में ग्लेसियल
ऐसीटिक अम्ल लेते हैं, फिर उसमें ऐसीटोनिलमाइड का
व्यक्तिगत रूप से लेकर उसे अच्छी तरह घोलते हैं।

★ रासायनिक अभिक्रिया:-



क्रियाविधि -



Expt. No. _____

Date _____

Page No. 21

विलयन को अच्छी तरह हिलाकर जामें सांद्र H_2SO_4 धीरे-धीरे मिलाते हैं, जामें विलयन हल्का गर्म हो जाता है।

- अब विलयन को जीसलीकारक मिश्रण (2 वर्फ + नमक) पर रखाकर अच्छी तरह हंडा करते हैं।

- अन्य परखनली में नाइट्रीकरण मिश्रण (Conc. H_2SO_4 + Conc. HNO_3) बनाते हैं, जामें ऐसिटैनिवाइड के मिश्रण को निकालकर कमरे के ताप पर लगभग एक घंटे तक रखते हैं, तत्पश्चात् आभिक्रिया मिश्रण को एक बीकर जिसमें छ्छा पानी है, में बूंद-बूंद करके अच्छी तरह हिलाते हुए मिलाते हैं।

- जामें नाइट्रो ऐसिटैनिवाइड अवक्षेपित हो जाता है, अवक्षेप को आधा घंटे तक रखने के पश्चात् चुनकर छीप द्वारा छान लेते हैं।

- अपरिष्कृत नाइट्रो ऐसिटैनिवाइड यॉगीक को फिल्टर पेपर के द्वारा व्युत्थान के पश्चात् एल्कोहल द्वारा क्रिस्टलीकृत करते हैं।

- पीले o-नाइट्रो ऐसिटैनिवाइड के कंगहीन क्रिस्टल प्राप्त होते हैं।

★ परिणाम (Result):-

लाव्ही - 0.5 g

M. P. - 213 - 215 °C

भौतिक अवस्था - पीले रंग का ठोस पदार्थ

निष्कर्ष

Teacher's Signature _____

★ सावधानियाँ (Precautions):-

1. अभिक्रिया उल्मा सेपी होती है अतः बीकर को अभिक्रिया के दौरान गीलीअरक मिश्रण में दीरखा जाता है।
2. उसमें तापक्रम का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
3. भार्य एवं पैरा नाइट्रोएसिटोनाइट के प्रथक करते समय अपनी सावधानी रखनी चाहिए।

Experiment - 5

★ उद्देश्य (Object) :- कार्बनिक यौगिक p-ब्रोमो ऐसिटोनिलाइड का ऐसिटोनिलाइड में बनाना।

★ आवश्यक सामग्री -

(a) रसायन (Chemical) :-

ऐसिटोनिलाइड

नल्लू ऐसिटिक अम्ल

ब्रोमीन

एल्कोहल या मिथाइलेट

स्प्रिट

(b) उपकरण (Apparatus) :-

बीकर , दो फ्लास्क , ल्यूरेट ,
हीप , फिल्टर पेपर ।


★ सिद्धांत (Theory) :-

ऐसिटोनिलाइड का ब्रोमीन की सहायता से ब्रोमीनीकरण करने पर मुख्य रूप से p-ब्रोमो ऐसिटोनिलाइड तथा कम मात्रा में o-ब्रोमो ऐसिटोनिलाइड का मिश्रण बनता है।


★ विधि (Procedure)

प्रथम एक फ्लास्क में ऐसिटोनिलाइड को नल्लू ऐसिटिक अम्ल में घोले है तथा

★ શાસાત્થનિક ઝમિલિયા :-



★ શિખારી :-



P - क्रोमो एसिटनिलाइड

Date _____

Expt. No. _____

Page No. 74

दूसरे पक्षारक में प्रोमीन को खैरास ऐसिटिक अम्ल में घोसकर विलयन बनाते हैं। इस प्रोमीन विलयन को ऐसीटेनिल्लाड विलयन में धीरे-धीरे पक्षारक के लगातार विसाते इस प्रयुक्तरी रीप या ब्लूट द्वारा जलते हैं

— यह मित्राण हल्के नांगी रंग का होता है। मित्राण को कुछ समय के लिए रख देते हैं।
यस मित्राण को एक बेकिंग में हिमशीतिल जल लेकर उसमें डालते हैं।

- प्राप्त ठोस पदार्थ को जानकर संख्या कर लेते हैं।
जो जल से घीते हैं। जो ठोस पदार्थ को लवकोदल की
न्यूनतम मात्रा में विखेय कर रख देते हैं।

- p- ब्रोमो एसिटोनीलाइट के व्यक्त रंग के क्रिस्टल बनते हैं
उन्हे फिल्टर पेपर से निक्षेपता से छानकर मलग
कर लेते हैं

★	परिणाम (Result) :-
---	--------------------

489 - 10

गम नांक - 166-170' C

भौतिक अणुशा - काफ़ेद हिस्सलीय ठोस

* सावधानियाँ (Precautions):—

1. इस प्रयोग में काम करने वाले वसायनों को उष्मक से दूर रखा जाता है, ताकि प्रयोगशाला में ठिमी भी फकार ही क्षति न पहुँचे।
2. किसी भी वसायन से ली गई मात्रा को सावधानीपूर्वक वेकर में लिया जाता है ताकि वसा लाल्टी में मात्रा सही हो।
3. अम्लिया में बहुत एल्कोहॉल ज्वलनशील होता है, इसलिए इसे सीधे उष्मा के संपर्क से दूर रखना चाहिए।

Experiment - 6

★ उद्देश्य (Object) :- कार्बनिक यौगिक आयोडोफॉर्म का ऐथेनॉल से बनना ।

★ आवश्यक सामग्री

(a) रसायन (Chemical) :-
 ऐथिल ऐल्कोहल - 5 ml
 सोडियम कार्बोनेट - 10 ग्र.
 आयोडीन - 10 ग्र.

(b) उपकरण (Apparatus) :-
 200 ml धारिता का फ्लास्क, जल उष्मक
 बुलबुल सीप, थर्मामीटर etc.

★ सिद्धांत (Theory) :-

यौगिक $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ या CH_3CO को ऐथिल ऐल्कोहल या एसिटिक एसिड से क्रिया कर
 आयोडोफॉर्म बनाते हैं।


★ विधि (Procedure) :-

200 ml. धारिता के फ्लास्क में
 5 ml. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, 10 ग्र Na_2CO_3 तथा
 50-60 ml. जल लेकर मिश्रण को जल उष्मक पर
 गर्म करते हैं।

अवधि

Teacher's Signature _____

★ रासायनिक अभिक्रिया



आयोडीन को अच्छी तरह पीसकर पाउडर बना लिया जाता है व ठोस प्लेस्क में विलयन को हिलाते हुए उसमें धीरे-धीरे 10 g. आयोडीन मिलाई जाती है।

तत्पश्चात् मिश्रण को जल उष्मक पर 70-80°C ताप पर गर्म करते हैं जब तक कि आयोडीन का रंग (बैंगनी) समाप्त न हो जाये।

- यदि आयोडीन का रंग थोड़ी देर तक गर्म करने पर समाप्त न होने की स्थिति में हो, उसमें 3-4 ml सोडियम हाइड्रॉक्साइड मिला देना चाहिए।

- विलयन को ठंडा करने पर आयोफार्म के पीले क्रिस्टल प्राप्त होते हैं।

- इसे जानकर ठंडे जल से धोते हैं तथा फिल्टर पेपर की सहायता से सुखा लेते हैं। उस ठोस पीले पदार्थ को ऐबेनॉस की न्यूनतम मात्रा से क्रिस्टलीकृत करते हैं।

★ परिणाम (Result) :-

लावण - 4.5 g.

तापमान - 120 - 122°C

ऑप्टिकल अवस्था - आयोफार्म के ठोस पीले रंग के क्रिस्टल

Experiment - 7

★ उद्देश्य (Object) :- कार्बनिक यौगिक 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल को फिनोल से बनाना ।

★ आवश्यक सामग्री -

(a) रसायन (Chemical) -
 फिनोल - 5g
 ब्रोमीन - 18 ml.
 बर्फ

(b) उपकरण (Apparatus) - फ्लास्क, गीप, बीकर etc.


★ विधि (Procedure) :-

एक फ्लास्क में 5g फिनोल लेकर पानी की कम मात्रा में घोल लिया जाता है। इसको बर्फ में ठंडा कर लेते हैं।
 - अब उसमें 18 ml ब्रोमीन को धीरे-धीरे गीप से ड्रॉप ड्रॉप कर अच्छी तरह हिलाते हुए फ्लास्क में मिलाते हैं। जिससे अपरूप प्राप्त होगा।

- पूरी ब्रोमीन मिलाकर अवशेषित यौगिक को छान लेते हैं तथा उसे ठंडे पानी से धो लेते हैं व फिल्टर पेपर पर सूखा लेते हैं।

- ठोस पदार्थ को एल्कोहल से क्रिस्टलीकृत कर लेते हैं।
 - रंगहीन, सुई के आकार के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं।

★ रासायनिक अभिक्रिया -



★ परिणाम (Result) :-

लावट - 12 g

गलनांक - 93 °C

भौतिक अपरश्चा - ठोस सुई के आधार के रंगहीन क्रिस्टल

Experiment - 8

★ उद्देश्य (Object) :- फीनॉल - जल निकाय के पारस्परिक विलेयता वक्र को आलेखित कर उस निकाय के लिए क्रांतिक ताप तथा उस पर विलयन का संघटन निर्धारित करना।

★ उपकरण :- वक्थन नलियाँ, थर्मामीटर, विलोडक, बीकर, संशोधित पीपेट।

★ वसाधन - शुद्ध फीनॉल, आसुत जल

★ सिद्धांत (Theory) :- दो द्रवों के मार जात कर वक्थन वक्थननली में लेकर अच्छी तरह हिलाते हैं। मिश्रण में दो परस्पर विलेय हैं, जो मिश्रण में आविलता के कारण धुंधल होती हैं।

- मिश्रण से गर्म करते हैं, और वह ताप (t_1) नोट करते हैं जिस पर आविलता समाप्त हो जाती है।

- अब वक्थननली से हंडा करते हैं वह ताप (t_2) नोट करते हैं जिस पर आविलता पुनः भी होती है।

- दोनों ताप t_1 व t_2 का औसत मान दोनों द्रवों का मिश्रणीय ताप होता है।

★ Calculation :-

$$\text{फिनोल का प्रतिशत} = \frac{w_1}{w_1 + w_2} \times 100$$

w_1 = फिनोल का भार , w_2 = पानी का भार

① $w_1 = 2$, $w_2 = 2$

$$\text{फिनोल का प्रतिशत} = \frac{2}{2+2} \times 100 = 50\%$$

② $w_1 = 2g$, $w_2 = 4$

$$\text{फिनोल का प्रतिशत} = \frac{2}{2+4} \times 100 = 33.3\%$$

③ $w_1 = 2$, $w_2 = 6$

$$\text{फिनोल का प्रतिशत} = \frac{2}{2+6} \times 100 = 25\%$$

④ $w_1 = 2$, $w_2 = 8$

$$\text{फिनोल का प्रतिशत} = \frac{2}{2+8} \times 100 = 20\%$$

⑤ $w_1 = 2$, $w_2 = 10$

$$\text{फिनोल का प्रतिशत} = \frac{2}{2+10} \times 100 = 16.6\%$$

⑥ $w_1 = 2$, $w_2 = 12$

$$\text{फिनोल का प्रतिशत} = \frac{2}{2+12} \times 100 = 14.2\%$$

⑦ $w_1 = 2$, $w_2 = 14$

$$\text{फिनोल का प्रतिशत} = \frac{2}{2+14} \times 100 = 12.57\%$$

मिश्रण के संघटनों को X-भस्म पर तथा उनके मिश्रण तापों को Y-भस्म पर आलेखित करते हैं।

- प्राप्त वक्र के उच्चतम बिंदु के संगत ताप को क्रांतिक विलयन ताप कहते हैं।

- उस बिंदु पर मिश्रण का संघटन क्रांतिक विलयन ताप पर मिश्रण के संघटन को प्रदर्शित करता है।

★ प्रेक्षण (Observation) :-

1. स्वयंन नली में फिनोल की मात्रा = 2g.

2. जल का घनत्व = 1 g/ml.

S.No	फिनोल का भार (w_1)	जल का भार (w_2)	फिनोल का प्रतिशत	संक्रमण ताप ($^{\circ}\text{C}$)		
				उर्ध्व	अवन	माध्यम
1	2 ml.	2 ml	50%	78 $^{\circ}\text{C}$	40 $^{\circ}\text{C}$	59
2	2 ml	4 ml	33.3%	75 $^{\circ}\text{C}$	45 $^{\circ}\text{C}$	60
3	2 ml	6 ml	25%	74 $^{\circ}\text{C}$	56 $^{\circ}\text{C}$	65
4	2 ml	8 ml	20.0%	72 $^{\circ}\text{C}$	60 $^{\circ}\text{C}$	66
5	2 ml	10 ml	16.6%	70 $^{\circ}\text{C}$	62 $^{\circ}\text{C}$	68.5
6	2 ml	12 ml	14.2%	60 $^{\circ}\text{C}$	64 $^{\circ}\text{C}$	62
7	2 ml	14 ml	12.57%	53 $^{\circ}\text{C}$	66 $^{\circ}\text{C}$	59.2





Fig:- क्रांतिक विलयन ताप ज्ञात करना



★ परिणाम (Result):-

फिनोल-जलतंत्र क्रांतिक विलयन ताप = 66°C

★ सावधानियाँ (Precautions):-

1. फिनोल विषैला व लवचा पर कफोले डालने वाला पदार्थ है। अतः इसका उपयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए।
2. मिश्रण का ताप बहुत धीरे-धीरे बढ़ाना और कम करना चाहिए।
3. मिश्रण को लगातार अच्छी प्रकार हिलाते रहना चाहिए।